


Информация на 28 июля 2025 г.

Прогноз синоптических условий в Южно-Курильском районе

29-31 июля над Курильскими островами будет преобладать малоградиентное барическое поле; в ЮКР ожидается спокойная погодная обстановка, маловетрие (1-3 м/с).

1-2 августа в СЗТО выйдет тропический вихрь “Кроса”, который начнет быстро смещаться на восток и заполняться, не вызывая ухудшения погодных условий в промрайоне.

3-4 августа над Прикурильским районом по-прежнему будет отмечаться малоградиентное поле, штиль.



Прогностические карты приземного давления и поля ветра над Курильским районом на 29 июля и 01 августа 2025 г. (из программы Windy.map).

Условные обозначения: **L** – центр циклона, **H** – центр антициклона; зеленой стрелкой обозначена прогностическая траектория перемещения циклона

Океанологические условия в районе к востоку от Японии и Курильских о-вов

Южнокурильский антициклонический вихрь А46 (ринг Куроисио с тёплым ядром), стационарирует в координатах 41°50'с.ш., 145°05'в.д. Вихрь малоподвижный, температура в его ядре составила 20-21°C. В предстоящую неделю температура в центре вихря будет медленно увеличиваться (рис.1). В вершине первого меандра Куроисио в центральных координатах 39°30'с.ш., 144°35'в.д. завершается образование нового антициклонического вихря – ринга Куроисио А47. В зоне субарктических вод сохраняется упорядоченность поверхностных структур – слабое образование мелкомасштабных циклонических (С) и антициклонических (А). Прослеживаются три ветви Ойяисио, первая ветвь аналогична прошлому году и занимает прибрежное положение. Вторая ветвь течения более развита, чем в прошлом году. Мощность основного потока Ойяисио на уровне прошлого года и продолжает снижаться. Субарктический фронт занимает положение близко среднемноголетнему, его расположение южнее прошлогоднего. Фронт Куроисио занимает южное положение. Воды Соя с температурой 15-20°C занимают весь Южно-Курильский пролив. С охотоморской стороны интенсивность потока течения Соя увеличивается, температура основного потока составляет 18-21°C, что выше прошлогодней на 3-5°C(рис.2).




Рис. 1. Температура поверхности океана и фронтальные зоны в СЗТО по судовым и спутниковым данным за 26 июля 2025 г. (JMA)

Условные обозначения:

А46, А47, Ав, А – антициклонические вихри; Ам1, Ам2 – меандры Куросио; С – циклонические вихри; О1, О2, О3 – ветви Ойасио.




Рис. 2. Скорость и направление течений на горизонте 50 м в СЗТО за 26 июля 2025 г. (JMA)

Условия, перспективные для формирования промысловых скоплений

Зона вод с поверхностной температурой менее 9°C уменьшается и меньше прошлогодней в ИЭЗ РФ (рис.3). Продолжается сезонное потепление ТПО начавшееся в третьей декаде марта. Темпы повышения ТПО за прошедшую неделю были ниже прошлогодних. В первой и второй ветвях Куроисио ТПО была ниже прошлогодней на $0-3^{\circ}\text{C}$. В субарктических водах и Ойясио ТПО была на уровне прошлогодней и незначительно выше. Соответственно, в Ойясио и в субарктических водах ТПО выше среднееголетней на $0-3^{\circ}\text{C}$, в первой и второй ветвях Куроисио выше на $2-5^{\circ}\text{C}$. В ближайшую неделю темпы прогрева ТПО будут выше прошлогодних, интенсивность всех ветвей Ойясио продолжит снижаться, а первой и второй ветвей Куроисио постепенно будет увеличиваться.




Рис. 3. Температура на поверхности океана в зоне Субарктического фронта по спутниковым данным за 26 июля 2023 (А), 2024 (Б) и 2025 (В) гг. (JMA). Показано положение изотермы 9°. Зеленым указаны районы работы иностранного флота на промысле сардины и скумбрии (в открытых водах), фиолетовым – российских судов.

На рисунке 4 показано прогностическое положение девятиградусной изотермы, фронтальных зон с градиентом более 0.03°C/миля и районов, благоприятных для формирования промысловых скоплений сардины и скумбрии в открытых водах и в ИЭЗ РФ.




Рис.4 Прогноз ТПО (выделена изотерма 9°C) и фронтальных зон в СЗТО на 31 июля 2025 г. (Нусом). Указаны районы ИЭЗ и открытых вод, перспективные для формирования промысловых скоплений скумбрии и сардины (розовые овалы).


Промысловая обстановка

В минувшую неделю российские суда лов сардины и скумбрии не вели (рис. 5). В настоящее время суда пелагической путины работают на других видах промысла. Основная причина - отсутствие разведанных скоплений сардины промыслового характера. Из-за особенностей развития океанологической обстановки в прикурильских водах миграции сардины проходят к востоку от традиционных районов промысла, в том числе и за пределами ИЭЗ России. Подходы сардины в район Южных и Средних Курильских островов ожидаются в ближайшее время.

Нарастающий вылов сардины иваси на 27 июля - 49877 т. Вылов скумбрии с начала промысла – 315 т.

На промысле сайры работают суда Японии, Южной Кореи, Тайваня, КНР, Вануату в открытых водах в приблизительных координатах 47°00' с.ш., 160°10' в.д. Промысловая обстановка достаточно хорошая, эффективность промысла превышает показатели последних 3 лет. На вторую декаду июля общий вылов составлял 18.9 тыс. т.

В открытых водах на лове пелагических объектов работают иностранные суда общим количеством 50-70 единиц, предположительно под флагом КНР.



*Обзор подготовили сотрудники лаб. промысловой океанографии ТИНРО:
 Новиков Ю.В., Глебова С.Ю., Капштер А.В., Басюк Е.О., Филатов В.Н.*